Informe de cultivo del 23 al 28 de Marzo de 2015.

Resumen

Finalmente después de las importantes precipitaciones registradas, las pérdidas de anegamiento, estarían por debajo del 5 %, y limitadas principalmente a los márgenes de los cursos de agua afectados por los desbordes, y los sectores de laguna. Sin embrago hay situaciones como las señaladas en la localidad de Las Varillas donde las pérdidas se estiman en torno al 30 o 40%.

Situaciones de anegamiento- Las Varillas-Córdoba- Ing. Agr. Paola Gianmalva AFA Subcentro Las Varillas

Preocupa, en gran parte de la zona de influencia de la Cooperativa, el estado de los caminos rurales, lo cual complica en gran medida, el transporte de los granos de cosecha.

EL avance de **Soja de Primera** puede observarse en el siguiente mapa

Porcentaje de avance de cosecha de soja Semana del 23 al 28 de Marzo de 2015



Los rendimientos medios se encuentran en torno a los 4500 kg con máximos de hasta 6000 kg/ha y pisos de rendimiento bastante elevados por encima de los 3500 kg/ha.

Se cita la presencia de granos verdes, y dificultades de cosecha por el alto volumen de material que ingresa a las cosechadoras, y la presencia de tallo verde que dificulta la actividad de los elementos de trilla.

Soja 1ra Humboldt Ing. Agr. Guillermo Gianinetto- AFA Humboldt

Cosecha de soja en Totoras Diego Perazzo AFA Totoras

La **soja de segunda** se encuentra finalizando el período de llenado, con lotes que ya muestran cambios de coloración en hojas acercándose a la madurez comercial. En los lotes de ciclos más largos o más atrasados, cabe señalar la presencia de roya en altos niveles de incidencia, que en muchos casos ya no justifican su control por lo avanzado de la fenología del cultivo.

Con respecto, el grado de avance de cosecha de **maíz**, este presenta una gran heterogeneidad. Por un lado la zona Norte se encuentra en grados de avance superiores al 80%, la zona Oeste y litoral se ubican alrededor del 50% de la superficie y la zona G6 y NBA la superficie cosechada es mucho menor, no superando el 20%. Los rendimientos se mantienen en buenos niveles, tal cual se señaló en informes anteriores.

El **maíz de segunda** afronta el período final de llenado de grano, con muy buenas expectativas de rendimiento, con presencia de enfermedades, las cuales no se están controlando por lo avanzado del estado del cultivo.

Informe por localidad

Localidad % Perdidas por anegamiento	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz	Maíz 2da
María Juana Según datos preliminares, el departamento castellanos tiene 672000 has, de las cuales 285000 tendrían soja. Con anegamientos temporarios estarían 137000 has, y con anegamientos permanentes 35000 has. De estas 35000 has aproximadamente el 50 % tendría soja que no se cosecharía, o sea sería aprox. un 6,15 % sobre soja total del departamento, pero a eso se le sumaria la perdida de soja en las zona afectadas por anegamientos temporarios.	Avance de cosecha 5 %, muy buenos rendimientos en campos con buen drenaje, el rango va de 40 a 52 qq/ha. Los mayores rendimientos se observan en lotes donde se mantiene la rotación de cultivos.	Estados fenológicos desde R5.5 a R7, presencia de enfermedades de fin de ciclo y enfermedades vasculares.	Avance de cosecha 90 %, rendimientos entre 90 a 140 qq/ha, en estos años de excelentes condiciones climáticas las diferencia de rendimiento son marcadas principalmente por el manejo, especialmente por la fertilización que se aplicó.	Estados fenológicos reproductivos, según fechas de siembra, se observan marcadas diferencias en la condición sanitaria según híbridos.

Localidad % Perdidas por anegamiento	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz	Maíz 2da
Cañada Rosquín las pérdidas por anegamiento no llegan a un 5 %, si no vuelven a caer lluvias de gran volumen recolectaremos toda la superficie sembrada	Cuando se está en un 5 % de superficie recolectada de Soja de Primera los rendimientos superan los 4.500 Kg/ha con lotes por arriba de 5.000 Kg.	Sin problemas significativos terminando llenado de granos, es probable que los rendimientos estén 1.000 Kg./Ha por debajo de la de primera.	Con rendimientos entre 9.000 y 10.000 Kg./Ha hay lotes de 12 y 13.000 Kg./Ha. Falta recolectar un 15 a 20 % de la superficie.	Excelente estado general, finalizando llenado granos.se estima cosecha fin de Mayo y Junio.
Firmat. No hay pérdidas por anegamientos	10-15 % de avance de cosecha. Rendimientos medios: 45 qq/ha, máximos: 57 qq/ha y mínimos: 38 qq/ha. Los lotes cosechados hasta el momento son los sembrados en fechas de mediados/fines de octubre y de alta productividad.	Estado fenológico: R6 - R7. Presencia de plagas: en algunos lotes puntuales se realizaron aplicaciones para el control de chinches.	20-25 % de avance de cosecha. Rendimientos medios: 100 qq/ha, máximos: 120 qq/ha y mínimos: 90 qq/ha.	Estado fenológico: grano pastoso, muy buen estado general.

Localidad % Perdidas por anegamiento	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz	Maíz 2da
Totoras No hubo pérdidas por anegamientos a causa de las últimas lluvias o por desborde de ríos y arroyos. Lluvia de Enero 193mm, Febrero 95mm y Marzo 157mm.	el % de avance de cosecha se calcula entre un 15% y un 20% con pisos de 40 qq/ha y techos de 58 qq/ha, realizando un promedio zonal ubicado entre los 4500 y 5000 Kg/Ha. Como observación se menciona las pocas has que se logran cosechar por día, debido a la cantidad de material a procesar por las cosechadoras y por el tallo verde que tienen las sojas de los primeros lotes a cosechar. Estos factores impiden aumentar las Has/hs de las máquinas y a abandonar la jornada de trabajo ni bien se esconde el sol.	Se observa Cercospora, Septoria y algunas chinches. Todas las sojas están en R6 o R7, por lo que no se realizarán más aplicaciones. El estado general es muy bueno.	Con el 80% de avance de cosecha se está logrando un promedio zonal de entre 100 a 105 qq/ha con pisos de 80qq/ha y techos de 130 qq/ha.	Entre R4 y R5. Se observó en su momento Roya, aunque esta se frenó en su avance sobre la planta. También se observó Tizón. Los materiales se comportaron diferentes ante esta enfermedad y muy pocos fueron aplicados. Estado general muy bueno.

Localidad % Perdidas por anegamiento	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz	Maíz 2da
Montes de Oca El área perdida es menor al 5%, Antes de esta lluvia se estuvieron cosechando lotes en los que el agua tapaba el alambrado, y se obtuvieron rendimientos de 20-25 qq/ha... y parte quedó sin cosechar.	10-20% de lotes cosechados, todos arriba de 40 qq/ha, más cerca de los 50 que de los 40.	Con respecto a la soja de 2da ya terminaron el llenado, están empezando a cambiar de color	70-80% con rendimientos entre 80 y 100 qq/ha, muy pocos pasaron los 100	En muy buenas condiciones; todavía en llenado de granos, se están empezando a observar manchas por tizón y algo de roya (según híbridos).
Los Cardos La pérdida por anegamiento: no es significante	El avance esta cerca al 30 %, rendimientos entre 40 y 55 qq/ha, hasta ahora muchos lotes cerca de 50 qq/ha.	terminando el llenado de grano sin presencia de enfermedades ni plagas y con muy buen desarrollo y numero de vainas	Cosecha alrededor del 50 %, rindes entre 110 y 130 qq/ha, más frecuente 115/120 qq/ha	Fin llenado de granos y con mucha presencia de roya y tizón, en general no se realizaron tratamientos con funguicidas
Chañar Ladeado área perdida por anegamiento, 15 %	15 % de avance de cosecha, el rinde promedio es de 47 qq/ha, máximos de 60 qq/ha y mínimos de 42 qq/ha. La variedad que más rinde es DM 3312, en siembras del 5 al 15 de octubre.	R 5.5 sin plagas ni enfermedades.	Todavía no se cosecharon muchos lotes, los primeros rondan los 125 qq/ha.	

Localidad % Perdidas por anegamiento	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz	Maíz 2da
Marcos Juárez El % perdida por anegamiento estaría en torno al 3 a 5 %. Mayor % en zona Norte de Leones y San Marcos.	35 % avance cosecha. Rendimiento promedio: 45 qq/ha. Mínimo: 35 qq/ha. Máximo: 62 qq/ha.	Están entre fin de R5 a R6. Presencia de algo de chinches y presencia normal de enfermedades.	15 % de avance de cosecha. Rinde promedio: 115 qq/ha. Mínimos 75 qq/ha. Máximos 150 qq/ha.	Grano pastoso. Muy buen estado general. Muy buena perspectiva de rendimiento.
Tortugas 5% del área de influencia afectada por anegamiento. También problemas serios en cuanto al estado de los caminos rurales que complican mucho el transporte de la producción.	Avance de cosecha del 15% en Soja de primera, con un rendimiento mínimo de 38 qq/ha un promedio de 44 qq/ha y un techo de 55 qq/ha.	Se encuentran en inicios de maduración. Sin problemas sanitarios de importancia y con chinches en bajos niveles de población.	45% de avance de cosecha, con un rendimiento mínimo de 80 qq/ha en zonas bajas planas, un promedio de 105 qq/ha y un techo hasta ahora de 130 qq/ha.	Se encuentran promediando el llenado de granos, con niveles poblacionales medios de isoca de la espiga, Roya y Tizón de la Hoja. Algunos lotes bajos presentan podredumbre de la base del tallo.
San Martin de las Escobas Perdidas por anegamiento 2 al 5 %	10 % de avance de cosecha rindes de 45 a 55 qq. - medios 50 qq/ha.	De R5-R6 con algo de chinches y septoria- Cercospora	60-70 % de avance de cosecha y rindes de 80 a 120 qq - promedio 100 qq/ha	En grano pastoso duro - sanidad presencia de tizón y roya – Se han tratado lotes El estado general es bueno.

Localidad % Perdidas por anegamiento	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz	Maíz 2da
Cañada de Gómez No se presentaron áreas anegadas.	30% de avance de cosecha. Rendimientos medios: 43 qq/ha. Máximo: 60 qq/ha. y mínimo 38 qq/ha.	Estado fenológico: R7.Presencia de anticarsia, medidora. Se tuvieron que realizar aplicaciones puntuales para control de chinche. Enfermedades: Presencia de Bacteriosis, septoria.	40 % avance de cosecha, con rendimiento medio de 110 qq/ha. Máximo: 140 qq/ha y mínimo de 75 qq/ha.	Se encuentra en grano pastoso. El estado sanitario en general es bueno pero con presencia de roya en la mayoría de los lotes.
Las Varillas El % del área perdida por anegamiento se encuentra entre un 30 y 40%	1% de avance de cosecha, hasta el momento, de lo cosechado el promedio es de 47.5 qq/ha, máximo 53 qq/ha, mínimo 42 qq/ha. Calidad de grano en general buena (algo de grano manchado y amohosado). La cosecha comenzó el fin de semana y se detuvo el martes debido a la lluvia (23 mm)	Estado fenológico, R6 a R7. Poca presencia de chinche, ya se realizaron aplicaciones. Leve presencia de enfermedades, (síndrome de muerte repentina, mancha marrón, tizón de la hoja, mildiu y mancha purpura de de la semilla).	Inicio de cosecha Hasta el momento el promedio es 97,5 qq/ha, máximos 110 qq/ha, mínimos 85/ha	Estado fenológico, R4 (grano pastoso) a R5 (grano dentado). Se observa leve presencia de Helminthosporium maydis (tizón foliar), Puccinia sorghi (roya)

Localidad % Perdidas por anegamiento	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz	Maíz 2da
Calchín - Cba. El porcentaje de área perdida por anegamiento ronda entre el 2 al 5 %. Hubo lotes que luego que bajo el agua se mantuvieron bien.	100 % cosechados. Rendimientos: Mínimos: 25 qq; Medios: 30; Máximo: 35 a 37 qq	R7 - R8. Presencia de Anticarsia controlada efectivamente por Nomuraea Mucha aparición hacia finales de R5 y comienzos de R6 del complejo de chinches predominando en la zona la chinche de la alfalfa (Piezodorus guildinii) en sus 5 estadios. Comenzaron a aparecer las EFC ya en estados muy avanzados de cultivo debido a que las mezclas de fungicidas aplicadas tempranamente ya no presentaban cobertura para el cultivo y debido a la baja en el precio que se estimaba no se repitieron las aplicaciones.	Rendimientos. Mínimo: 55 a 60 (los más tempranos), Medios: 65 - 70 qq y Máximos: 75 - 80 qq en los mas tardíos.	Estado fenológico: R4 - R5. Pese a las grandes precipitaciones que se registraron y la gran humedad que predomino durante los meses de Enero y Febrero, el comportamiento de los diferentes híbridos fue bueno a muy bueno. Solo algunos materiales presentaron síntomas (por tizón, roya o ambas) severos en la porción media del canopeo pudiendo causar disminuciones significativas de rendimiento, sino los síntomas se concentraban en las hojas inferiores.

Localidad % Perdidas por anegamiento	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz	Maíz 2da
Rojas No se ha perdido área por anegamiento ya que las últimas lluvias han sido moderadas.	El porcentaje de avance de cosecha es del 7%. Los rendimientos oscilan entre 40 y 60 qq.	Se encuentra en R6 - R7. En casos puntuales hay ataques de chinches y anticarsia. Se observan muy pocas pústulas de roya de la soja.	El porcentaje de avance de cosecha es del 12%. Los rendimientos oscilan entre 75 y 140 qq/ha.	Se encuentra en grano dentado y presenta una situación sanitaria normal para la zona.
Godeken:	En soja de 1º tenemos un avance de cosecha del 40 % aproximadamente, con rendimientos promedios entre 45-50 qq. (Mínimos de 42 qq y máximos de 60 qq).	Se encuentran entre R6 y R7 con una muy buena expectativa de rendimiento, sin presencia de plagas ni enfermedades que justifiquen un control.	Con respecto a maíz el avance de cosecha se ubica en el 10-15% con rendimientos promedio por el momento de 90 - 100 qq aproximados (los mejores lotes todavía no se trillaron).	
Labordeboy. 3% de superficie perdida por anegamiento	15 % de avance de cosecha en soja de primera con un rendimiento medio de 43, máximos de 57, y mínimos de 37.	En R6-R7 con presencia de chinches y fin de ciclo.	15 % de cosecha con rendimientos medios de 110, máximos de 140, y mínimos de 85.	Maíz de segunda en muy pocos lotes, se encuentra en llenado de granos.

Localidad % Perdidas por anegamiento	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz	Maíz 2da
Casilda % del área perdida por anegamiento es de aprox. 4000 has por desborde del Río Carcarañá.	10-15% de avance de cosecha. Rendimientos medios de 45 qq/ha, máximos de 58 qq/ha y mínimos de 35 qq/ha.	Estado fenológico R6, sin presencia de plagas y enfermedades.	30% de avance de cosecha. Rendimientos medios de 110 qq/ha, máximos 130 qq/ha y mínimos de 95 qq/ha.	Estado fenológico R4/R5 (pastoso/dentado), situación sanitaria regular.
Humboldt Perdida por anegamiento: 5 %, correspondiendo a zona bajas, con poca pendiente, napas altas, agrandamiento de lagunas, zonas aledañas a canales y arroyos que desbordaron. La zona más afectada es la comprendida entre la Ruta 70 (al norte), la Ruta 19 (al Sur), la Ruta 6 (al Este) y la Ruta 10 (al Oeste).Hay problemas con el estado de los caminos rurales. La actividad más afectada en nuestra zona por las contingencias climáticas fue el tambo, con pérdida casi total de pasturas y mermas importantes de producción.	Todavía no se ha cosechado ningún lote de soja, la semana próxima se comenzaría con los primeros. El exceso de agua en algunas zonas, ha producido pérdida total de plantas y en algunos sectores un adelantamiento marcado del ciclo, lo que de alguna manera va a repercutir negativamente en los rendimientos de estos sectores, igualmente cabe aclarar que los rendimientos en el resto de la zona van a ser muy buenos.	Estado fenológico R5,5 a R6 , con respecto a plagas chinche y en enfermedades roya, septoria y aumento de Cercospora kikuchii. La mayoría de los lotes ya se han tratado tanto para insectos como para enfermedades.	90 % de avance de cosecha. Rendimientos medios 8500 Kg/ha, máximos 10000 Kg ha y mínimos de 7000 Kg/ha.	Estado fenológico entre grano lechoso y grano pastoso (R3 a R4) , con respecto a situación sanitaria presencia de tizón.

Localidad % Perdidas por anegamiento	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz	Maíz 2da
Bigand y zona El área perdida por anegamiento sería de un 5-10%	% de avance de cosecha en Chabas 15-20 %, Sanford 30 % , Bigand y Carmen del Sauce 5-7 % . Rendimientos medios 47, máximos 55 y mínimos 35. En algunos lotes se observa un secado desparejo del cultivo, con rodeos y presencia de tallo y granos verdes que dificultan la cosecha.	Estado fenológico R6, se observa presencia de plagas y enfermedades pero por debajo del umbral.	% de avance de cosecha entre un 25-30 %. Rendimientos medios de 100 qq/ha, máximos 130 qq/ha y mínimos 85 qq/ha. Marcando la diferencias entre estos valores debido a la aplicación de tecnología, ya sea por elección de hibrido como por fertilización.	Estado fenológico en Grano pastoso.
Villa María 30% del área perdida por anegamiento.	35% de avance de cosecha. Rendimientos medios de 35qq con máximos de 48qq registrados, y mínimos de 30qq.	Estado fenológico en R6 y R7, sin presencia de plagas en importancia.	5% de avance de cosecha. Rendimientos medios de 100qq. Máximos de 110qq y mínimos de 80qq/ha.	Estado fenológico entre fin de identación y madurez fisiológica, situación sanitaria buena.

Localidad % Perdidas por anegamiento	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz	Maíz 2da
Junín 10 % del área perdida por anegamiento.	5 % de avance de cosecha con rendimientos medios de 4.000 Kg/Ha, máximos de 5.200 Kg/Ha y mínimos: 3.500 Kg/Ha Se está viendo en la entrada de soja a planta cerca de un 5% de granos verdes y algo de chauchas verdes.	Estado fenológico: R6 Presencia de plagas: Chinches de la alfalfa y verde en su mayoría. En menor porcentaje chinche de los cuernos. Enfermedades: Presencia de Septoriosis en el 1/3 superior del cultivo.	Presenta el 10% de avance de cosecha. Los rendimientos medios son de 10.000 los máximos: 12.000 y los mínimos: 8.000 Kg/Ha.	
Arteaga: % de área anegada: la superficie anegada es muy baja, solo un 4-5 %.	El porcentaje de avance de cosecha es aproximadamente un 10 %, con rindes promedio de 45 qq/ha; con picos de 53 qq y mínimos de 41 qq. Se observa presencia de granos y chauchas verdes.	Fenológicamente se encuentran en fines de R6 - comienzos de R7.Por el momento se observa presencia de chinche de los cuernos y un aumento de la población de chinche verde y de la alfalfa, pero en bajos niveles.	El porcentaje de avance de cosecha es de un 50 %, con rindes promedios de 110 qq/ha; con máximos de 142 qq y mínimos de 102 qq.	Fenológicamente se encuentran en R4-R5, con respecto a la situación sanitaria se observa presencia de pústulas de roya y tizón en muy bajos niveles sin necesidad de aplicación. También se observa gran cantidad de gorgojos en espigas.

Localidad % Perdidas por anegamiento	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz	Maíz 2da
Villa Eloisa	10 % de avance de cosecha con rendimientos medios de 48 qq/ha con picos de 57 qq/ha y piso de 40 qq/ha. La cosecha se presenta demorada por falta de piso y en general los lotes salen secos pero con presencia de granos verdes.	Estado fenológico R7 a R8 con desarrollo muy bueno, sin plagas ni enfermedades de importancia.	20 % de avance de cosecha con rendimientos medios de 95 qq/ha con picos de 140 qq/ha y piso de 71 qq/ha.	Estado de grano pastoso duro a madurez fisiológica, sin problemas de vuelco ni enfermedades.
Gálvez – San Carlos La pérdida por anegamiento es sobre todo campos con lagunas o en zonas bajas pero no es de gran porcentaje, 5% aproximadamente.	Se comenzaron a cosechar los primeros lotes con rendimientos muy buenos para la zona 4500 -5600 kg/ha; pero solo algunos lotes aislados.	En estadios de R5.5 – R6 sacando algunos lotes sembrados muy tarde.	El 60 % de avance de cosecha. Rendimientos promedios de 10500 kg/ha, con rendimientos máximos de 13500 kg/ha y mínimos de 7000 kg/ha.	En estadios de grano lechoso – grano pastoso, muy buenas condiciones de crecimiento y desarrollo en general.

Localidad % Perdidas por anegamiento	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz	Maíz 2da
Salto Grande	El avance de cosecha ronda del 15 al20%, los rendimientos hasta el momento van desde los 36 qq/ha. (Mínimo), muchos lotes están en los 48 qq/ha. Y máximo de 58 qq/ha.	En general se encuentran en R6 - R7, se han realizado tratamientos para el control de chinches. También se observó en algunos lotes presencia de roya asiática, pero debido al estadio fenológico del cultivo y la baja severidad no fue necesario realizar tratamientos.	Se están cosechando los últimos lotes (90% de avance de cosecha) los rendimientos Mínimos 85 qq/ha. medios de 105qq/ha y máximos de 140 qq/ha	En general se encuentran en R3-R4 con un muy buen estado y con muy buenas expectativas de rendimientos. Con respecto al perfil sanitario se observa roya y tizón pero en muy baja incidencia y severidad.
Bell Ville Aún sigue habiendo dificultades en los caminos para llegar a los lotes. Se estima un porcentaje perdido por anegamiento cercano a un 20% para el área de influencia.	El avance de la cosecha esta en un orden del 15% viene a ritmo lento debido a que hay complicaciones en el piso, en donde las maquinarias se entierran y dificultades para llegar a los lotes por caminos inaccesibles. Rinde Máximo: 57 qq/ha; Rinde Medio: 44 qq/ha; Rinde Mínimo: 37 qq/ha.	Se encuentra en R7, se observan bajas poblaciones del complejo de chinches aunque solo los controles se realizan en lotes destinados a semilla si el piso y los accesos lo permiten.	10% de avance, se dejo de cosechar para comenzar con Soja. Rinde Máximo: 120 qq/ha; Rinde Medio: 94 qq/ha; Rinde Mínimo: 88 qq/ha.	Se encuentra en R4, se observan algunas pústulas de Roya, la incidencia es baja.

Localidad % Perdidas por anegamiento	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz	Maíz 2da
Las Rosas La superficie perdida por anegamiento es mínima, en la zona el agua corrió. Solo hay pequeñas superficies que por napa próxima dificulta la cosecha pero no están pérdidas.	Avance de cosecha del 10%. Los rendimientos de los pocos lotes cosechados hasta el momento andan entre los 45- 50 - 57qq/ha.	Están entre R6 y R7. Se detectó roya en grupos 5 y 5.5. Y hay altas poblaciones de chinches. Se ha detectado roya asiática en cultivos de soja de 2º siembra, variedades NA 5009 y 5509.	80 % de avance. Los rendimientos rondan entre 100 - 115 - 140 QQ/ha	Estarían en grano pastoso. Hay tizón.
Serodino En la zona de influencia, el área perdida por anegamiento es solo un 2-3%.	La cosecha lleva un 10% de avance, con Rendimientos desde 4.000 hasta 5.500 kg/ha, con un promedio de 4.700 kg/ha por el momento.	Los lotes se encuentran en R6 - R7.5, con muy buen estado general de cultivo. Como plagas presentes puede citarse al complejo de chinches, pero en bajas poblaciones. En cuanto a las Enfermedades, hay presencia de Septoria, Cercospora, Bacteriosis, y Muerte Súbita. En la mayoría de los lotes la incidencia es baja debido a que se han realizado aplicaciones de funguicidas.	La cosecha ya ha finalizado, con Rendimientos desde 9.000 hasta 12.500 kg/ha, con un promedio de 10.500 kg/ha.	Los lotes se encuentran finalizando la etapa de llenado de granos, con muy buen estado general de cultivo. En cuanto al perfil sanitario se puede citar la presencia de Roya y Tizón, este último en algunos casos con niveles de Severidad por encima del umbral de Control.

Localidad % Perdidas por anegamiento	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz	Maíz 2da
Bombal No es grande la superficie perdida por anegamientos, estimamos un 2% del área	Se ha cosechado solamente un 5% de la soja de primera, con rendimientos medios altos de 45 qq, mínimos de 40 qq y máximos de 58 qq. Se han cosechado los ciclos cortos sembrados temprano, en los cuales las buenas condiciones climáticas durante todo su ciclo han permitido expresar sus máximos potenciales	Estados desde R5 A R7. Baja población de chinches en lotes que no se han tratado. Alta incidencia y severidad de septoria en lotes que no se ha aplicado fungicida.	15 % de avance de cosecha. Rendimientos medios de 95 qq/ha, mínimos de 80 y máximos de 120 qq/ha	Estado fenológico en llenado de grano (pastoso duro). Alta severidad de roya y tizón en materiales susceptibles.
Chovet Es mínima la superficie con problemas de anegamiento.	Cosecha 5-10%. El grueso se sembró en noviembre. Rinde medio 47 , mínimo 43 y máximo 65 qq/ha. El promedio de los lotes de mayores rendimiento está cerca de los 50qq/ha.	Se encuentran en R6. Algo de chinches, gata peluda. Enfermedades vasculares. Septoria. Cercospora.	Avance de cosecha del 5 %. Rindes mínimos 75 qq maximos135qq. Medio 100- 105 qq/ha.	Muy poca sup, en su mayoría en grano pastoso. Se observa Roya y algo de Helminthosporium.

Localidad % Perdidas por anegamiento	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz	Maíz 2da
Pergamino Área perdida por anegamiento 10%	Avance de cosecha de soja 5%. Rendimiento medio 40 qq/ha, máximo 60 y mínimo 25 qq/ha	Estado Fenológico R6.	Avance de cosecha 40%. Rendimiento medio 90 qq/ha Máximo 150 y Mínimo 60 qq/ha	
Alcorta. Por el momento no hay pérdidas por anegamiento.	El avance de cosecha es de un 5% a un 10%. Los rendimientos medios son de 48 qq, con máximos de 60 qq y mínimos de 40 qq.	Estado fonológico R6 a R8. El complejo de chinches es la principal plaga observada en este momento. En cuanto a enfermedades se observaron lotes con ataques considerables de Fusarium solani; también se detectan enfermedades como Cercospora sojina, Cercospora kikuchii, y Septoria glycines ninguna de severidad considerable .	El avance de cosecha es de un 10 %. Los rendimientos medios son de 95 qq con máximos de 120 qq y mínimos de 70 qq.	El estado fonológico es madurez fisiológica. Se observan enfermedades tales como Roya y Tizón.

Localidad % Perdidas por anegamiento	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz	Maíz 2da
Pilar En la zona, no se han determinado pérdidas por anegamiento, lo dificultoso son las condiciones de los pisos para realizar la cosecha y los caminos para el transporte de la mercadería.	No ha comenzado la cosecha, las estimaciones rondan los 3500 kg/ha hasta habiendo casos de 4000 kg/ha.	Estado fenológico R6, leve ataque de chinches, se realizaron en muy escasos lotes control.		No comenzó aún la cosecha, el estado se encuentra en R4 – R5, se observa en muchos casos espigas vanas, libres de insectos y sanitariamente en buen estado. Sorgos: Comienzo de Madurez Fisiológica, se estima unos rendimientos cercanos a los 6000 kg/ha, se prevé realizar en algunos lotes tratamientos de secado para adelantar la cosecha.
Villa del Rosario La superficie con anegamiento no es importante, solo se observan inconvenientes en sectores de laguna.	Son puntuales los lotes que se cosecharon, los rindes oscilan los 3800 kg/ha.	Estado Fenológico. R6, los lotes más atrasados hay algo de Anticarsia y medidoras, sin necesidades de aplicación. Sin inconvenientes de enfermedades .	Todavía no se cosecho nada de lo que es de primera. La humedad de grano se encuentra alrededor de 20 puntos de hº.	Se encuentra en llenado de grano la situación sanitaria es buena. No se hacen funguicidas

Localidad % Perdidas por anegamiento	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz	Maíz 2da
J. B. Molina	El cultivo de soja de primera se encuentra entre R7-R8. (madurez comercial). Durante esta semana se han cosechado lotes de siembras tempranas y de grupos cortos, los cuales han presentado en general niveles de rendimiento muy buenos. En estos días se estaría avanzando en la cosecha de lotes que por el momento no tienen piso. Rendimientos máximo 48 qq, mínimo 37 qq. Avance de cosecha 5 %.	Se encuentra en R5.5, se han realizado tratamientos por presencia de anticarsia semanas anteriores. Alto porcentaje de control natural.		Estado Fenológico: R4, buen estado sanitario.
Maggiolo En cuanto a perdidas por anegamientos rondarían un 10%.	Se cosecho un 20% Rendimientos Max: 55 qq, Medios: 50 qq Mínimos: 38qq.	Estado R6-R6.5 sin plagas ni enfermedades.	Se cosecho un 30% Max: 130 qq Medios: 100, Mínimos: 80 qq	Se encuentra en la etapa de llenado de grano