

## Informe de cultivo del 11 al 16 de Agosto de 2014.

### Resumen:

El cultivo de **Trigo** presenta un muy buen estado general, el mismo se encuentra atravesando el período de macollaje, logrando una cobertura del entresurco del 80%. En situaciones de siembras tempranas, algunos lotes comienzan la etapa de encañado.

Desde el punto de vista sanitario, se cita la presencia de mancha amarilla, favorecida por las condiciones de humedad registradas hasta el momento. También se destaca la incidencia de roya en cultivares de alta susceptibilidad. No obstante lo señalado, la situación sanitaria, por el momento, no presentan graves problemas.

Tampoco es un inconveniente la presencia de plagas, solo en algunos casos puntuales se ha manifestado algunos daños de gusano blanco.

La ocurrencia de precipitaciones ha acelerado el proceso de degradación de los herbicidas de suelo, por lo que se observan nacimientos de malezas tales como Bowlesia, Bolsa de pastor, Peludilla y Rama negra, que obligan a la aplicación de herbicidas postemergentes.

Los lotes de **Cebada**, al igual que los de trigo, presentan buen estado general del cultivo, encontrándose los mismos, en etapa de macollaje y sin inconvenientes de plagas ni enfermedades. Como se citara en informes anteriores, es notoria la disminución del área de este cultivo en comparación a la campaña pasada.

Con respecto a la **Arveja**, los últimos lotes sembrados se encuentran en emergencia mientras que los más tempranos alcanzan el estado de 8 nudos. Presentan un buen estado general del cultivo sin presencia de plagas ni enfermedades.

Las perspectivas de siembra de **Maíz**, teniendo como parámetro la reserva de semilla híbrida, son poco alentadoras. La mayoría de los Técnicos, coincide en que el área para este cultivo sufriría una disminución de aproximadamente un 20%, con respecto a la campaña pasada. La caída de los márgenes agrícolas, el bajo precio a futuro y la menor liquidez para afrontar un cultivo de alta inversión, serían las principales causas que explican esta decisión. Solo en las zonas donde el grano se destina para consumo animal en forma local, es de esperar que la superficie con este cultivo se mantenga.

### Informe por localidad

Localidad	Trigo	Cebada	Arveja	Campaña de maíz
Villa Eloisa	<p>Los largos cubrieron bien el surco, en pleno macollaje. Los ciclos cortos con entresurcos más descubiertos, en inicio de macollaje.</p> <p>Todos sanos y sin plagas. Solo en muy pocos lotes 10/15% nacimientos de malezas, principalmente Bowlesia, y bolsa de pastor. Se observa un ataque de roya importante en la variedad Baguette 11</p>			<p>A esta fecha tenemos vendido el 60% de la semilla de la campaña pasada, se estima que se alcanzaría 70/75% dependiendo de las condiciones climáticas y principalmente el precio maíz futuro. Caería el área de siembra entre un 25 a 30 %.</p>
Serodino	<p>El estado general del cultivo es muy bueno. Fenológicamente, los ciclos largos se encuentran en plena etapa de Macollaje (4-6 macollos por planta), mientras que en los grupos cortos recién están iniciando el macollado (2-3 macollos por planta). Se está completando la cobertura del entre surco en los grupos largos, principalmente en aquellos lotes que se sembraron temprano. Dentro de las enfermedades, se observan, en los lotes más avanzados, Mancha Amarilla y pequeñas pústulas de Roya Anaranjada en hojas inferiores. No hay presencia de plagas insectiles, pero si se ha observado en varios lotes escapes de malezas en cultivos ya implantados, los cuales han justificado controles químicos durante el Macollaje.</p>	<p>No se ha hecho Cebada en nuestra zona.</p>	<p>Hay muy pocos lotes de Arveja en nuestra zona, los cuales se encuentran con 3 hojas totalmente expandidas, y sin presencia de plagas ni enfermedades.</p>	<p>Por el momento, en Serodino nos encontramos en el mismo nivel de reservas de semilla de Maíz que la campaña pasada. Por lo tanto, se prevé que se siembre con este cultivo, la misma área que el año pasado. Por otro lado, se estima un aumento del área de siembra Tardía y de Segunda en detrimento de la siembra tradicional de Septiembre.</p>

Localidad	Trigo	Cebada	Arveja	Campaña de maíz
Las varillas	En la zona se han sembrado únicamente Ciclos Largos, L estado general del cultivo es muy bueno. Fenológicamente se encuentran en macollaje. Han cubierto entre el 40 y el 50 % del entresurco. Se observa una incidencia leve de enfermedades foliares. No hay nacimiento de malezas.	La cebada implantada en la zona es únicamente para pastoreo de tambos.	No hay registros de siembra de este cultivo	Con respecto a la campaña pasada se registra para esta fecha el mismo nivel de reserva. La mayor parte de lo que se produce se consume en la zona
Crespo	El estado general del cultivo va de Bueno a Muy Bueno. Con respecto a ciclos largos, ya se observan lotes en inicio de encañazón y en el caso de ciclos cortos el estado fenológico va desde 2-3 hojas hasta macollaje. Se observan lotes con presencia de mancha amarilla (Dreschlera). En los casos donde se ha realizado el barbecho químico con anticipación, dado las altas precipitaciones se ha producido escapes de malezas.			La campaña de maíz evoluciona en forma tranquila, en estos últimos 10 días se han realizado varias reservas de semillas. Nuestra zona se caracteriza por la presencia de granjas avícolas, lo que determina que la siembra de maíz sea una necesidad a pesar de los precios.
María Juana	En macollaje, estado muy bueno, algunos lotes se repasaron por malezas, sin enfermedades de importancia, se registran algunos lotes con daño por gusano blanco.	No hay lotes en la zona de influencia.	No hay lotes en la zona de influencia.	Pocas consultas, menor intención de siembra que el año pasado, se podría decir que hacía muchos años que no había tanto desinterés por compra de semilla de maíz, por lo menos en nuestra zona. Se prevé un menor área de maíz, que podría estimarse, en principio en un 20 %.

Localidad	Trigo	Cebada	Arveja	Campaña de maíz
Pilar (Cba)	Estado general Bueno, Ciclo largo en pleno macollaje, plena cobertura del entresurco. Libre de enfermedades, aun sin presencia de plagas.			Disminución de la superficie, aún no se puede determinar la variación debido a que se están terminando de levantar los lotes sembrados en diciembre y enero. En cuanto a la intención de realizar cultivo de sorgo se encuentra disminuido a su mínima expresión de los últimos cuatro años, siendo casi nula su intensidad de siembra.
Humboldt	En general se encuentran en pleno macollaje tanto los de ciclo largo, como los de ciclo corto. Los de ciclo largo están en mejores condiciones, han macollado más y han cubierto bien el entresurco. Los de c. corto, han macollado muy poco y les cuesta cubrir el entresurco. Se observa mancha amarilla en las hojas basales en algunos materiales pero todavía por debajo del umbral de control. Plagas hasta el momento no hay. En algunos lotes hubo nacimiento de malezas que obligo realizar el control químico. Este año en comparación muy pocos productores han refertilizado con nitrógeno, debido principalmente al bajo precio del trigo a futuro.	No hay lotes en la zona de influencia.	No hay lotes en la zona de influencia.	La reserva de semilla de maíz viene muy tranquila, un 30 % inferior con respecto a la campaña anterior para la misma fecha. Vemos un incremento en la demanda de materiales precoces y ultra precoces, principalmente los productores que tienen tambor, lo cosechan como grano húmedo y le permite sembrar detrás una soja tardía u otro maíz.

Localidad	Trigo	Cebada	Arveja	Campaña de maíz
Bell Ville	<p>Los Trigos de ciclo largo como los cortos se encuentran en pleno macollaje. Los más largos 2,5 y los más cortos 2,2 (Escala fenológica Zadoks et al). Se observan daños a nivel de tejido foliar a raíz de las heladas intensas ocurridas estas últimas semanas, siendo los más afectados los trigos sembrados más tarde con menor desarrollo, aunque los daños por el estado fenológico en que se encuentran no son significativos en la definición del rendimiento debido a la capacidad de generar nuevos tejidos foliares. Se observa un cubrimiento parcial del entresurco. No hay presencia aún de síntomas o signos de enfermedades como así tampoco nacimiento de malezas y presencia de plagas.</p>	<p>En Cebada hay muy poca superficie sembrada en la zona. El estado es similar al Trigo.</p>		<p>La reserva de Semilla de Maíz es baja a lo largo de este mes. Las bajas cotizaciones en los mercados a término y la situación coyuntural de País, generan pocas expectativas a los Productores de la zona a la hora de definir la siembra de este cultivo. De no revertirse la situación se ve muy comprometida su siembra en situaciones de arrendamiento.</p>
Alcorta	<p>Comienzo a pleno macollaje. El estado es bueno, no se observan plagas ni enfermedades. Las siembras tempranas de junio, comienzan a tapar el entresurco. En la mayoría se ha realizado Misil como postemergente</p>			<p>Las reservas de maíz, son bajas, por el momento menor a la campaña pasada. Se podría llegar a sembrar menos que el año pasado por el momento resulta difícil estimar un porcentaje.</p>

Localidad	Trigo	Cebada	Arveja	Campaña de maíz
Villa Amelia	Presentan un estado general del cultivo muy bueno, se encuentran en principio de encañazón, en el caso de los ciclos largos y en macollaje los cortos, cubriendo muy bien el entresurco. Sin presencia de enfermedades e insectos. Las aplicaciones pre siembra se realizaron con agroquímicos residuales, por lo cual no se encuentran malezas en el cultivo.	El estado general del cultivo, es muy bueno. Se encuentra en macollaje. Con muy buena cobertura del entre surco. Sin presencia de enfermedades ni insectos.	Se encuentra lotes recién emergiendo hasta lotes en estado v3. Estado sanitario muy bueno. Sin presencia de enfermedades ni insectos.	Se está terminando de cosechar el maíz de segunda y tardío con muy buenos rendimientos. Promedio de 100 qq/ha.
Bigand y Subcentros	El estado general del Cultivo es Muy Bueno, encontrándose el mismo en macollaje, Z 2.1 - Z 2.3 donde los ciclos largos sembrados más tempranos ya están por cubrir casi en su totalidad el entresurco. Con respecto a Enfermedades se observa una muy baja incidencia de Mancha Amarilla, sin presencia de plagas. En lotes donde se hicieron los barbechos tempranos hubo nuevos nacimientos de malezas dentro de los cultivos por lo que se tuvo que hacer control de las mismas.	Estado general del cultivo es Bueno, sin presencia de enfermedades, plagas ni malezas.	Estado general del cultivo es Bueno, entre Emergencia y 3 Nudos. Sin presencia de enfermedades, plagas ni malezas.	La reserva de semillas hasta el momento es bastante inferior con respecto al año pasado y de seguir las condiciones del mercado como ahora se estima una reducción en el área de siembra de entre 15-20%.

Localidad	Trigo	Cebada	Arveja	Campaña de maíz
Maciel	<p>El cultivo de trigo se encuentra en macollaje con mayor o menor desarrollo según ciclos y fechas de siembra. El estado general es muy bueno y ya han cubierto el entresurco un alto porcentaje de los lotes. En cuanto a enfermedades ya se observa la presencia de roya de la hoja y mancha amarilla, lo que hace prever el uso generalizado de fungicidas próximamente. En muchos lotes se observa nacimiento de malezas dentro del cultivo pero no son tan graves como para recomendar una aplicación de herbicida.</p>			<p>Con respecto a la campaña de maíz podría decirse que la situación es similar a la campaña pasada en cuanto a la compra y reserva de semilla y por ahora no parece que se vea reducida el área de siembra de maíz de primera a pesar del escenario desfavorable que aparece en cuanto a precios y costos.</p>
Calchín	<p>El estado general es muy bueno. Se encuentran en macollaje cubriendo entre el 80 y el 90 % del entresurco, para el caso de los lotes tempranos con ciclos Intermedio Largo y en lotes sembrados cerca de mediados de junio vienen más lentos, con 50 % de cobertura. Se detectó en algunos lotes mancha amarilla, favorecida por las condiciones húmedas que se dieron en este otoño - invierno. No se detectaron plagas por el momento. En lotes muy puntuales hubo nacimientos de malezas.</p>	<p>No hay registro de cebada</p>	<p>No hay registro de arveja.</p>	<p>Por lo que se percibe y viendo el precio que tiene el maíz es probable que se reduzca en un 10 % el área sembrada.</p>

Localidad	Trigo	Cebada	Arveja	Campaña de maíz
Villa del Rosario	Se encuentran en muy buen estado, en pleno macollaje, con muy buena cobertura del entresurco. Con respecto a enfermedades se observa en algunos casos con mancha amarilla. No hay presencia de plagas hasta el momento. En la mayoría de los lotes hay escapes de malezas, el metsulfuron tuvo menos días de efecto residual que lo estimado y comenzaron los escapes, algunos lotes ya se aplicaron con hormonales.			La venta de semillas de maíz, está paralizada el panorama es crítico. Los productores están a la expectativa de los precios que tiene el cereal en los futuros de la campaña 2015. Con seguridad habrá una reducción del área
Tortugas y General Roca (Cba)	Se encuentran en muy buen estado general tanto aquellos de ciclo corto como de ciclo largo. Aunque se han sembrado en un 90% largos e intermedios. El aspecto sanitario es bueno, no se observa presencia de plagas y en general muestran una buena cobertura del entresurco. Hasta ahora no hay nacimientos de malezas.	No se sembró	No se Sembró	Con respecto a la venta de semilla de maíz comenzó tarde en parte porque muchos lotes aún no se habían cosechado y los productores estaban a la expectativa de los resultados. Comenzó con mucha intensidad y después fue decayendo a medida que iba disminuyendo el precio en el mercado. Estimamos un 20 % menos de intención de siembra respecto al año pasado.



Localidad	Trigo	Cebada	Arveja	Campaña de maíz
Montes de Oca	Estado general de Bueno a Muy Bueno, en macollaje, con buen desarrollo y cobertura (quedan de cubrir aquellos lotes sembrados a 26 cm entre líneas. Sin presencia de insectos ni enfermedades; todos los lotes fueron replicados con herbicidas hormonales y residuales debido al escape de malezas.		Muy buena emergencia, segundo nudo visible, y zarcillos simples (102).	Con respecto a la reserva de semilla de maíz, llevamos aproximadamente el 60% del promedio (vs la campaña anterior es el 35%). Estimamos que de seguir los costos actuales el área de maíz disminuiría de manera importante.
Firmit/Godeken	El estado general es muy bueno, en pleno macollaje, totalmente cubierto el entresurco. Sin presencia de plagas ni enfermedades. En algunos lotes hubo escape de malezas hoja ancha donde se tuvieron que realizar los tratamientos para su control.	No hay en la zona	No hay en la zona	La reserva de semilla de maíz con respecto a la campaña pasada en esta misma fecha presenta una disminución del 35%. Se estima una reducción del 20% del área del cultivo con respecto a la campaña pasada.
San Martín de las Escobas	Se encuentra en macollaje, desde inicios del periodo hasta cobertura total del entresurco. Sin inconvenientes de enfermedades ni plagas. Se están haciendo algunos tratamientos de herbicidas.	La situación de Cebada es similar a la del trigo	Se encuentra con 8 hojas y zarcillos (10-15 cm. altura). Sin problemas sanitarios ni de plagas	Con respecto a la venta de semilla de maíz, se vendió menos que el año pasado y se prevé por el momento, una menor superficie, aproximadamente un 20%.

Localidad	Trigo	Cebada	Arveja	Campaña de maíz
Cañada de Gomez	El estado en general es muy bueno, el cultivo se encuentra en estado de Macollaje, el porcentaje de cobertura de entre surco es del 85% en el caso de los largos y del 25% en los Cortos, Se presentan mancha amarilla. Hay nacimientos de Bolsa de pastor, Peludilla, Rama negra, Caapiquí. El 50% y el 20% de los lotes con ciclos largos y corto respectivamente se tuvieron que volver aplicar herbicidas para controlar los escapes.			Tenemos un 30% menos de reserva de semilla de Maíz con respecto a la campaña pasada y las expectativas de ventas no son muy alentadoras. Se prevé una reducción del área sembrada del 25%.
Marcos Juarez	Estado general del cultivo Muy Bueno-Excelente. Estado fenológico Macollaje a Encañazon, cobertura entre surco 80%-100%. Hay nacimiento de malezas, Peludilla, rama negra, ortiga, viola y perejilillo.	No hay Lotes	No hay Lotes	La reserva de semilla está muy fría de parte de los productores, fundamentado por los bajos precios del cereal. Se prevé una reducción del área con este cultivo de aproximadamente un 20%.

Localidad	Trigo	Cebada	Arveja	Campaña de maíz
Chañar Ladeado	Los trigos están en pleno macollaje, empezando a cubrir bien el entresurco, están en muy buen estado general, sin enfermedades. Hay nacimiento de malezas en lotes donde se hizo metsulfuron. Lo que han sido tratados con Finesse presentan mejor control.			La reserva de semilla de maíz está en un 75 % de lo que se había vendido el año pasado para esta fecha. Hasta hace unos 20 días parecía que se iba a sembrar un 10 % más que el año pasado, hoy se estima que difícilmente se llegue a la superficie del año pasado.
Labordeboy	El estado general de los trigos es bueno sin presencia de enfermedades ni plagas, solamente en algunos lotes hubo escapes de malezas.	Con respecto a cebada no hay sembrada en la zona.	No hay sembrada en la zona.	La reserva de semilla de maíz es inferior al año pasado, creo que tendremos una reducción del área de un 20% aproximadamente.
Cañada Rosquin	Trigo ciclo largo: se encuentran en macollaje con buena cantidad de macollos logrados, sin presencia de plagas y muy buen estado general. Se puede mencionar presencia de mancha amarilla localizada en lotes con anegamientos y comienzan a encontrarse pústulas de roya en variedades de trigo susceptibles a esta enfermedad. El entresurco se encuentra cubierto en un 80%. Trigo ciclo corto: están en inicios de macollaje sin presencia de plagas ni enfermedades. El entresurco			Con respecto a las ventas de maíces estamos un 10 % por encima de la campaña pasada, impulsada por compra de nuevos socios, por lo que estimamos que la superficie sembrada se va a mantener.

	<p>está cubierto en un 40 %. En lotes sembrados con alta humedad se tuvieron que hacer repaso para malezas, principalmente dominaban bowlesia, ortiga mansa y rama negra. En el resto de los lotes se comienzan a ver bajos nacimientos de malezas que por el momento no serán controlados.</p>			
--	---	--	--	--