

Informe de cultivo semana del 9 al 14 de abril del 2012.

Resumen:

Las labores de cosecha se han llevado adelante con total normalidad y a buen ritmo registrándose un avance muy importante con respecto al informe anterior. Según las estimaciones de los Ingenieros de AFA se ha superado el 80% del área del cultivo en gran parte de la zona Norte, Litoral, Oeste y G6, mientras que para la zona NBA el avance de cosecha es del 50%. Los rendimientos registrados siguen mostrando fluctuaciones muy importantes, y con rendimientos menores a los esperados.

La soja de segunda, en el caso de siembras tempranas, comenzó a cosecharse en algunas zonas, con rendimientos alrededor de los 2000 a 2500 kg/ha. Los lotes sembrados más tarde aún se encuentran en etapas de llenado de grano, y sigue la presencia del complejo de chinches.

Hay registros de mala calidad de granos tanto para el caso de los lotes de primera como de segunda, atribuibles a factores climáticos, sanitarios y/o de plagas. Esta situación condicionaría en algunos casos la disponibilidad de semilla para la próxima campaña.

El maíz de primera, estaría superando el 50% del avance de cosecha con rendimientos promedio en torno a los 50 qq/ha.

El maíz de segunda se encuentra entre estado de grano pastoso y madurez fisiológica.

Resumen por localidad

Localidad	Soja de 1ra	Soja de 2da	Maíz 1ra	Maiz 2da
Villa Eloisa	Avance de cosecha del 100 % Rinde más frecuente 35 qq/ha	Avance de cosecha 50 %. Rinde promedio 28 qq/ha. Problemas de calidad de granos	Avance de cosecha 80 % Con un rinde de 75 qq/ha	Estado de madurez fisiológica. Sin daños
Casilda	90% avance de cosecha Rendimientos	Estado fenológico R7-R8.	Rendimientos desde 60 qq/ha a 110 qq/ha,	Se encuentran entre grano dentado (R5) y

	desde 22qq a 52 qq/ha, promedio de 33 qq/ha	Rendimientos desde 24qq a 30 qq/ha, sobre los primeros lotes cosechados 40% avance de cosecha	promedio hasta el momento de 80 qq/ha.	madurez fisiológica. Rindes estimados 70-80qq/ha
Rojas	Soja 1ª: El porcentaje de avance de cosecha es 50 % y el rendimiento más frecuente es de 28 qq/ha.	Soja 2ª: el estado fenológico es R6.	Maíz: El porcentaje de avance de cosecha es del 50 % y el rendimiento mas frecuente es 30 qq/ha.	Maíz 2ª: El 60% de los lotes llegó a madurez fisiológica
San Martín de las Escobas	Se concreto un 75 % de la cosecha con rindes de 15 a 28 qq/ha	Se encuentran en R7-R8 y algunos lotes se comienzan a cosechar	Prácticamente se concretó la cosecha con rindes de 45 a 65 qq/ha. Sorgo con rindes mínimos de 40 qq/ha y máximos de 80 qq/ha	Grano pastoso a duro

Localidad	Soja de 1ra	Soja de 2da	Maíz 1ra	Maiz 2da
Crespo (Entre Rios)	La soja de primera arroja rindes que van desde 18-20 qq, en promedio, en algunos casos se han obtenido rindes de 30 qq/ha, pero casos muy puntuales. El porcentaje de avance de cosecha es el 65 %	La soja de segunda se encuentra en R6 y en algunos casos ya en R7. Se observa presencia de Piezodorus y Nezara.	La cosecha de maíz de primera ha finalizado, los últimos lotes con rendimientos comprendidos entre 45-60 qq.	Los lotes de maíz de segunda sembrados temprano ya se hallan en madurez fisiológica.
Pilar (Córdoba)	Avance de la cosecha del 50%. Rendimientos de alrededor de unos 32 qq/ha	Estado Fenológico R7 – R8 Se observaron en lotes más atrasados efectos de las bajas temperaturas	SORGO: Los lotes se encuentran a la espera de la cosecha, aquellos que han sido cosechados obtuvieron rendimientos de 70qq/ha.	Los lotes de maíz se encuentran en estado de madurez fisiológica, hubo una leve afección por bajas temperaturas
Firmat	Avance de cosecha 90 % Rendimiento 20-40 qq/ha Promedio: 32 qq	Estado fenológico: R6-R7. Presencia de plagas: chinches	40% avance de cosecha: Rendimientos de 35-90qq/ha. Promedio: 70-75 qq/ha	No llego a madurez fisiológica. Pueden registrarse pérdidas de rendimiento por bajas temp.

Localidad	Soja de 1ra	Soja de 2da	Maíz 1ra	Maiz 2da
Pergamino	Avance de cosecha 60% Rendimientos de 2500 kg/ha	Est Fenol: R5-R7 Complejo de chinches	Avance de cosecha : 80% 4000 kg/ha	El 50 % alcanzó madurez fisiológica
Serodino	95 % avance de cosecha Rendimiento más frecuentes: 2700-3000 kg/ha	Estado fenológico: R7-R8. Presencia de plagas: Chinches No se prevén pérdida de rendimiento por las bajas temperaturas.	90% avance de cosecha Rendimientos más frecuentes: 5000 kg/ha	Estado fenológico en grano lechoso.
Tortugas	90 %Avance de cosecha. Rendimientos de 34 qq/ha	Estado Fenológico: R6.5-chinches	Se cosechó el 80% del maíz con rendimientos de 85 qq/ha.	El 80% de los lotes llegaron a madurez fisiológica.

Localidad	Soja de 1ra	Soja de 2da	Maíz 1ra	Maiz 2da
Godeken	95% avance de cosecha Mínimos: 26 qq/ha – Máximos: 45 qq/ha. Promedio: 32-35qq	Estado fenológico. R6-R7 Las bajas temperaturas afectaron el llenado de grano de las chauchas de los nudos superiores produciendo una merma de rendimiento. Esta semana comienza la cosecha de los lotes sembrados más temprano	50 % avance de cosecha Rendimientos Mínimo: 50 qq/ha Máximo: 110 qq/ha Promedio: 70-80 qq/ha.	Estado fenológico R5. Las bajas temperaturas van a producir una merma de rendimiento.
Maggiolo.	60% de avance de cosecha Rendimientos de 2500-3000 Kg/ha	El estado Fenológico de las sembradas en diciembre es R7y las de siembras de enero R6,5. Hasta ahora, no se esperan pérdidas de rendimiento por las bajas temperaturas.	50% de avance de cosecha y rendimientos más frecuentes 6000 Kg/ha.	En la mayoría de los casos, ya llegó a madurez fisiológica.

Localidad	Soja de 1ra	Soja de 2da	Maíz 1ra	Maíz 2da
Marcos Juárez Lluvias de 6 mm 03/04 y 7 mm el 09/04	90% de avance de cosecha Promedio: 32 qq/ha	R7-R8 Presencia de Chinchas	Avance de cosecha 75% con rendimiento 75 qq/ha	Todavía no llegó a Madurez Fisiológica
Los Cardos	Cosechado un 80% del área con rindes entre 10 a 42 qq /ha.-los mayores rindes, en el área de influencia Los Cardos a San Jorge.-	Buen desarrollo del cultivo se espera en nuestro área rendimientos aceptables. comenzó la cosecha con rindes alrededor de 20 qq/ha. solamente un mínimo porcentaje.-	Maíz se ha cosechado el 90% con rendimientos entre 30 a 85qq/ha.	Maíz de 2da en buenas condiciones.
Montes de Oca	50% de avance de cosecha, con rindes según zona. Entre 18 y 25qq/ha en el oeste y entre 35 y 45 qq/ha en el este.	Estado R5.Con problemas de chinchas. Por ahora sin problemas por bajas temperaturas	60 % cosechado. Rindes según zona. Al oeste promedio 45 qq/ha (entre 30 y 50). Al este promedio 90 qq/ha(entre 80 y 115)	No llegó a madurez fisiológica, fueron sembrados el 15/1. Pueden registrarse pérdidas de rendimiento por bajas temperaturas.

Localidad	Soja de 1ra	Soja de 2da	Maíz 1ra	Maiz 2da
Armstrong	Soja 1ra 100 % cosechado, con rendimientos de 3000 a 4000 Kg/Ha Promedio general aprox. 3500 kg/ha	Estado fenológico R8, y se han cosechado algunos lotes puntuales con rendimientos de 30 qq/ha. El grueso de la soja de segunda estaría comenzando en 10 días.	Maíz registra un 70% de avance de cosecha. Picos de rendimiento de 4000 a 11000 kg /ha	El maíz de segunda aún no llegó a Madurez fisiológica.
Nogoyá Lluvias 15-30 mm el 05/04	El avance de cosecha en la soja de primera esta en el orden del 15% con rendimientos bajos para la soja de grupos IV largo y V cortos, los mismos rondan entre los 10 y 18 qq/ha, éstos valores mejoran al incrementar los grupos de madurez.	Las sojas de segunda se encuentran entre R6 y R7, se observa algo de chinche marrón y de la alfalfa.	Los maíces de primera rindieron entre 30 y 50 qq,	Los maíces de segunda están en grano pastoso.

Localidad	Soja de 1ra	Soja de 2da	Maíz 1ra	Maiz 2da
Bigand	Soja 1ra 80 % avance de cosecha Rendimientos de 2500 kg/ha algunos lotes superaron los 4000 kg	Estado fenológico R4 a R6 Complejo de chinches muy pocos lotes con problemas	Creemos que sí habrá pérdidas por baja temperatura Recién se lleva cosechado aprox. un 10 % del área de Maíz con rendimientos de 6000 kg/ha, en muy pocos casos llegaron a 8500 kg.	La mayoría en pleno llenado de granos, creemos que alguna merma habrá
Maria Juana Marzo: 168 mm	Avance de cosecha 80 % Rendimientos de 28 qq/ha	Estado Fenológico R6.5 chinches	Se cosechó el 100% del maíz con rendimientos de 60 qq/ha	El 70 % de los lotes aun no llegaron a madurez fisiológica.
Chovet En abril las lluvias variaron entre 2mm (pueblo) a 10 mm El lunes pasado	Soja 1ª: Cosechado el 85% de la superficie Rinde promedio 2700 Kg/ha	Soja 2ª- R5- R7. Se estima entre 15 - 20 qq/ha. Complejo de chinches.	Maíz: 30% cosechado. Rinde En Chovet entre 70-90 qq/ha. Hacia Melincué y Elortondo 25-70 qq/ha. Promedio : 65 - 70 qq/ha	

Localidad	Soja de 1ra	Soja de 2da	Maíz 1ra	Maiz 2da
Arteaga	95% avance de cosecha del. Rendimientos más frecuentes. 2500 kg/ha En mejores ambientes 3500 kg/ha. Muchos productores no pudieron guardar semilla, por la mala calidad	Estado fenológico. -R7 Presencia de plagas, muchos lotes con mala calidad de semilla , producida por varios factores climáticos, enfermedades y las chinches	90% avance de cosecha. Rendimientos más frecuentes. 5000 kg/ha en mejores ambientes 9000 kg/ha Sorgos , primeros lotes 6000 a 7000 kg/ha	Pueden registrarse pérdidas de rendimiento por bajas temperaturas
Cañada Rosquin	Avance cosecha 80% Con rendimientos desde 15qq a 45qq/ha.	De R7 a precosecha, sin presencia de plagas.	Se completó la cosecha con rendimientos de 30 qq a 85 qq/ha.	Se encuentran en grano pastoso.
Bombal 2 mm 10/04	Avance de cosecha 90 % Rendimientos de 30-35 qq/ha	Estado Fenol: R6-R7 anticarsia- chinches, que ya han sido controladas	Se cosechó el 25% del maíz con rendimientos de 50 qq/ha	Los lotes sembrados del 10 de diciembre en adelante no han alcanzado la madurez fisiológica todavía. Muy buen estado
Arrecifes	Avance de cosecha hasta el momento 15% . Los pocos lotes que entraron están en 25-30qq/Ha	Estado fenológico R6. La mayoría de los lotes ya se han tratados para chinche y orugas.	50% avance de cosecha. Rendimientos más frecuentes. 35-40 qq/Ha	Se encuentran en madurez fisiológica. No se registran pérdidas de rendimiento por bajas temperaturas.